

**Liste d'identification 2023 français**

| Noms français                     | Noms latins                               | Noms français                          | Noms latins                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Agaric à chapeau plat             | Agaricus placomyces                       | Amanite fauve                          | Amanita fulva                               |
| Agaric à pied bulbeux             | Agaricus abruptibulbus                    | Amanite jaune paille                   | Amanita sinicoflava                         |
| Agaric champêtre                  | Agaricus campestris                       | Amanite jaune rougissante              | Amanita flavorubens                         |
| Agaric des jachères               | Agaricus arvensis                         | Amanite lignophile                     | Amanita lignophila                          |
| Agaric occidental                 | Agaricus silvaticus var. occidentalis     | Amanite minuscule                      | Amanita minutula                            |
| Agaric sylvicole                  | Agaricus silvicola                        | Amanite porphyre                       | Amanita porphyria                           |
| Agrocybe de l'érable              | Agrocybe acericola                        | Amanite précoce                        | Amanita praecox Y. Lamoureux nom. prov.     |
| Amanite noirâtre                  | Amanita subnigra                          | Amanite pseudo-fulva                   | Amanita pseudofulva                         |
| Amanite à grand voile             | Amanita magnivelaris                      | Amanite pseudo-volvata                 | Amanita pseudovolvata Tulloss nom. prov.    |
| Amanite à pied déguenillé         | Amanita rhacopus                          | Amanite rougissante                    | Amanita amerirubescens Tulloss nom. prov.   |
| Amanite à tête blanche            | Amanita albiceps Y. Lamoureux nom. prov.  | Amanite rougissante, variété blanche   | Amanita rubescens var. alba                 |
| Amanite à voile jaune             | Amanita flavoconia                        | Amanite tue-mouches, variété blanche   | Amanita muscaria var. alba                  |
| Amanite abrupte                   | Amanita abrupta                           | Amanite tue-mouches, variété de Güssow | Amanita muscaria var. guessowii             |
| Amanite allongée                  | Amanita elongata                          | Amanite vaginée                        | Amanita vaginata s. l.                      |
| Amanite bisporigère               | Amanita bisporigera                       | Amanite versicolore                    | Amanita variicolor                          |
| Amanite blanc ocré                | Amanita albocreata                        | Amanite vireuse                        | Amanita amerivirosa                         |
| Amanite brunissante               | Amanita brunnescens                       | Amanite zonée                          | Amanita fuscozonata Y. Lamoureux nom. prov. |
| Amanite brunissante, variété pâle | Amanita brunnescens var. pallida          | Armillaire commun                      | Armillaria ostoyae s. l.                    |
| Amanite chargée                   | Amanita onusta                            | Armillaire couleur de miel             | Armillaria mellea                           |
| Amanite citrine                   | Amanita citrina                           | Armillaire impérial                    | Catathelasma imperiale                      |
| Amanite de Frost                  | Amanita frostiana                         | Armillaire moutarde                    | Armillaria sinapina                         |
| Amanite de Jackson                | Amanita jacksonii                         | Armillaire ventru                      | Catathelasma ventricosum                    |
| Amanite de Morris                 | Amanita morrisii                          | Auriculaire d'Amérique                 | Auricularia americana                       |
| Amanite de Wells                  | Amanita wellsii                           | Bolbitie superbe                       | Bolbitius callisteus                        |
| Amanite élancée                   | Amanita elongator Y. Lamoureux nom. Prov. | Bolet à pied court                     | Suillus brevipes                            |
| Amanite élevée                    | Amanita magna                             | Bolet à pied creux                     | Suillus ampliiporus                         |
| Amanite fausse-brunissante        | Amanita submaculata                       | Bolet à pied glabrescent               | Hemileccinum subglabripes                   |
|                                   |                                           |                                        |                                             |
| Bolet à pied glanduleux           | Suillus glandulosipes                     | Bolet élégant                          | Suillus grevillei                           |
| Bolet à pied jaune vif            | Harrya chromipes                          | Bolet faux-chrysenteron                | Boletellus chrysenteroides                  |

|  | Noms français              | Noms latins                    |  | Noms français             | Noms latins                 |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
|  | Bolet à pied noir          | Leccinum atrostipitatum        |  | Bolet faux-piperatus      | Chalciporus piperatoides    |
|  | Bolet à pied orné          | Retiboletus ornatipes          |  | Bolet gercé               | Leccinum rimulosum          |
|  | Bolet à pied ponctué       | Suillus punctipes              |  | Bolet glanduleux          | Suillus glandulosus         |
|  | Bolet à pied rose          | Caloboletus roseipes           |  | Bolet grêle               | Austroboletus gracilis      |
|  | Bolet à pied variable      | Boletus variipes var. fagicola |  | Bolet immangeable         | Caloboletus inedulis        |
|  | Bolet à pied velu          | Boletus subvelutipes           |  | Bolet insigne             | Leccinum insigne            |
|  | Bolet à spores tronquées   | Xerocomellus truncatus         |  | Bolet insolite            | Leccinum insolens           |
|  | Bolet acide                | Suillus acidus                 |  | Bolet intermédiaire       | Xerocomellus intermedius    |
|  | Bolet affine               | Xanthoconium affine            |  | Bolet ivoire              | Suillus placidus            |
|  | Bolet alutacé              | Suillus subalutaceus           |  | Bolet marron              | Gyroporus castaneus s.l.    |
|  | Bolet amer                 | Tylopilus felleus              |  | Bolet orangé              | Leccinum aurantiacum        |
|  | Bolet bai                  | Imleria badia                  |  | Bolet parasite            | Pseudoboletus parasiticus   |
|  | Bolet bicolore             | Baorangia bicolor              |  | Bolet peint               | Suillus spraguei            |
|  | Bolet blanc-de-neige       | Leccinum holopus               |  | Bolet poivré              | Chalciporus piperatus       |
|  | Bolet bleuissant           | Gyroporus cyanescens           |  | Bolet pomme de pin        | Strobilomyces floccopus     |
|  | Bolet brun                 | Butyriboletus brunneus         |  | Bolet porphyre            | Porphyrellus porphyrosporus |
|  | Bolet brun rouge           | Tylopilus rubrobrunneus        |  | Bolet remarquable         | Suillus spectabilis         |
|  | Bolet brun rougeâtre       | Boletus subluridellus          |  | Bolet rouge olivâtre      | Boletus miniato-olivaceus   |
|  | Bolet champêtre            | Hortiboletus campestris        |  | Bolet rouge pâissant      | Boletus miniatopallescens   |
|  | Bolet couleur de boue      | Suillus luteus                 |  | Bolet rubigineux          | Chalciporus rubinellus      |
|  | Bolet couleur de datte     | Xerocomus spadiceus            |  | Bolet rugueux             | Leccinum scabrum            |
|  | Bolet d'Amérique           | Suillus americanus             |  | Bolet singulier           | Sutorius eximius            |
|  | Bolet de Clinton           | Suillus clintonianus           |  | Bolet tardif              | Suillus elbensis            |
|  | Bolet de Ravenel           | Pulveroboletus ravenelii       |  | Bolet veiné               | Boletinellus merulioides    |
|  | Bolet de Snell             | Leccinum snellii               |  | Boviste plombée           | Bovista plumbea             |
|  | Bolet de Weaver            | Suillus weaverae               |  | Calocère cornue           | Calocera cornea             |
|  | Bolet des épinettes        | Leccinum piceinum              |  | Cèpe à pores bleuissants  | Boletus subcaerulescens     |
|  | Bolet des montagnes Huron  | Boletus huronensis             |  | Cèpe d'Amérique           | Boletus chippewaensis       |
|  | Bolet doré                 | Suillus subaureus              |  | Cératiomyxie fruticuleuse | Ceratiomyxa fruticulosa     |
|  |                            |                                |  | Cératiomyxie poroïde      | Ceratiomyxa porioides       |
|  |                            |                                |  |                           |                             |
|  | Chanterelle à flocons      | Turbinellus floccosus          |  | Clitocybe lignicole       | Ossicaulis lignatilis       |
|  | Chanterelle claviforme     | Gomphus clavatus               |  | Clitocybe lumineux        | Omphalotus illudens         |
|  | Chanterelle commune        | Cantharellus enelensis         |  | Clitocybe odorant         | Clitocybe odora             |
|  | Chanterelle des Appalaches | Cantharellus appalachiensis    |  | Clitocybe omboné          | Cantharellula umbonata      |

| Noms français            | Noms latins                   | Noms français                   | Noms latins                             |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Clavaire en pilon        | Clavariadelphus pistillaris   | Clitocybe orangé                | Hygrophoropsis aurantiaca               |
| Clavaire cendrée         | Clavulina cinerea             | Clitocybe orangé, forme blanche | Hygrophoropsis aurantiaca f. albida     |
| Clavaire corail          | Clavulina coralloides         | Clitocybe pruineux              | Rhizocybe pruinosa                      |
| Clavaire cornue          | Clavulinopsis corniculata     | Clitocybe roux                  | Hygrophoropsis rufa                     |
| Clavaire couronnée       | Artomyces pyxidatus           | Clitocybe squamuleux            | Infundibulicybe squamulosa              |
| Clavaire d'Amérique      | Clavariadelphus americanus    | Clitopile petite prune          | Clitopilus prunulus                     |
| Clavaire de Sacchaline   | Clavariadelphus sachalinensis | Collybie à grandes spores       | Hymenopellis megalospora                |
| Clavaire de Zollinger    | Clavaria zollingeri           | Collybie à mille feuillets      | Baeospora myriadophylla                 |
| Clavaire fragile         | Clavaria fragilis             | Collybie à ocelle               | Clitocybula oculus                      |
| Clavaire fusiforme       | Clavulinopsis fusiformis      | Collybie à pied strié           | Gymnopus striatipes                     |
| Clavaire jolie           | Clavulinopsis laeticolor      | Collybie à pied velouté         | Flammulina velutipes                    |
| Clavaire petite langue   | Clavariadelphus ligula        | Collybie à poils blancs         | Strobilurus albidipilatus               |
| Clavaire rugueuse        | Clavulina rugosa              | Collybie bicolore               | Marasmiellus dichrous                   |
| Clavaire tronquée        | Clavariadelphus truncatus     | Collybie brunâtre               | Gymnopus brunneolus                     |
| Clavaire vermeille       | Clavaria rubicundula          | Collybie brunissante            | Hymenopellis rubrobrunnescens           |
| Clavaire vermillon       | Clavulinopsis sulcata         | Collybie butyracée              | Rhodocollybia butyracea                 |
| Clitocybe à pied renflé  | Ampulloclitocybe clavipes     | Collybie confluyente            | Marasmiellus confluens                  |
| Clitocybe blanchâtre     | Leucocybe candicans           | Collybie crin-de-cheval         | Gymnopus androsaceus                    |
| Clitocybe conné          | Leucocybe connata             | Collybie de Rodman              | Megacollybia rodmanii                   |
| Clitocybe d'Amérique     | Clitocybe americana           | Collybie drapée d'or            | Cyptotrama chrysopepla                  |
| Clitocybe des Adirondack | Singerocybe adirondackensis   | Collybie du chêne               | Gymnopus dryophilus                     |
| Clitocybe des feuilles   | Clitocybe phyllophila         | Collybie en touffe              | Connopus acervatus                      |
| Clitocybe des troncs     | Clitocybe truncicola          | Collybie en troupes             | Clitocybula familia                     |
| Clitocybe en entonnoir   | Infundibulicybe gibba         | Collybie fétide                 | Gymnopus foetidus                       |
| Clitocybe faux-clavipes  | Clitocybe subclavipes         | Collybie furfuracée             | Hymenopellis furfuracea                 |
| Clitocybe grisâtre       | Clitocybe metachroa           | Collybie luxuriante             | Marasmiellus luxurians                  |
|                          |                               | Collybie maculée                | Rhodocollybia maculata                  |
|                          |                               | Collybie maculée, variété jaune | Rhodocollybia maculata var. scorzonerea |
|                          |                               |                                 |                                         |
| Collybie queue-de-souris | Baeospora myosura             | Cortinaire clair                | Phlegmacium claricolor                  |
| Collybie tubéreuse       | Collybia tuberosa             | Cortinaire couleur d'argile     | Aureonarius toceus                      |
| Conocybe d'Arrhenius     | Pholiotina arrhenii           | Cortinaire d'Arménie            | Cortinarius armeniacus                  |
| Conocybe rugueux         | Pholiotina rugosa             | Cortinaire des chiens           | Cortinarius caninus                     |
| Coprin à chapeau lisse   | Parasola leiocephala          | Cortinaire des montagnes Huron  | Cortinarius huronensis                  |

| Noms français               | Noms latins                   | Noms français                     | Noms latins                            |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Coprin à disque sépia       | Tulosesus plagioporus         | Cortinaire des sphaignes          | Thaxterogaster sphagnophilus           |
| Coprin chevelu              | Coprinus comatus              | Cortinaire des teinturiers        | Cortinarius tinctorum                  |
| Coprin des forêts           | Coprinellus silvaticus        | Cortinaire du peuplier            | Phlegmacium populinum                  |
| Coprin des troncs           | Coprinellus truncorum         | Cortinaire gras                   | Cortinarius trivialis s.l.             |
| Coprin impatient            | Tulosesus impatiens           | Cortinaire humide                 | Cortinarius evernius                   |
| Coprin micacé               | Coprinellus micaceus          | Cortinaire laineux                | Cortinarius laniger                    |
| Coprin noir d'encre         | Coprinopsis atramentaria      | Cortinaire lubrifié               | Cortinarius delibutus                  |
| Coprin plissé               | Parasola plicatilis           | Cortinaire multiforme             | Thaxterogaster multiformis             |
| Cordyceps langue-de-serpent | Tolypocladium ophioglossoides | Cortinaire pied-bot               | Thaxterogaster scaurus                 |
| Cortinaire blanchâtre       | Phlegmacium albidum           | Cortinaire puant                  | Cortinarius camphoratus                |
| Cortinaire à bracelets      | Cortinarius armillatus        | Cortinaire ridé                   | Cortinarius caperatus                  |
| Cortinaire à lames espacées | Cortinarius distans           | Cortinaire rouge brique           | Cortinarius bolaris                    |
| Cortinaire à lames orange   | Cortinarius malicorius        | Cortinaire safran                 | Cortinarius croceus                    |
| Cortinaire à marge brisée   | Cortinarius aff. infractus    | Cortinaire sanguin                | Cortinarius sanguineus                 |
| Cortinaire à odeur de poire | Cortinarius traganus          | Cortinaire somptueux              | Aureonarius callisteus                 |
| Cortinaire à pied bot       | Cortinarius valgus            | Cortinaire vert de chrysolite     | Cortinarius chrysolitus                |
| Cortinaire à pied courbe    | Cortinarius aff. torvus       | Cortinaire violacé                | Cortinarius iodes                      |
| Cortinaire à pied flexueux  | Cortinarius flexipes          | Cortinaire violet                 | Cortinarius violaceus                  |
| Cortinaire à pied radicaux  | Phlegmacium argutum           | Cortinaire visqueux               | Cortinarius collinitus                 |
| Cortinaire à tête velue     | Cortinarius angelesianus      | Coryne verte                      | Coryne atrovirens                      |
| Cortinaire admirable        | Phlegmacium aff. praestans    | Craterelle couleur de flamme      | Craterellus ignicolor                  |
| Cortinaire aigu             | Cortinarius acutus            | Craterelle en tube                | Craterellus tubaeformis                |
| Cortinaire anormal          | Cortinarius anomalus          | Craterelle jaunissante            | Craterellus lutescens                  |
| Cortinaire blanc-violet     | Cortinarius alboviolaceus     | Crépidote à spores fusiformes     | Crepidotus fusisporus                  |
| Cortinaire bleuté           | Phlegmacium cyanites          | Crépidote aplani                  | Crepidotus applanatus                  |
| Cortinaire brun             | Cortinarius brunneus          | Crépidote de Kauffman             | Crepidotus kauffmanii                  |
|                             |                               | Crépidote du gommier              | Crepidotus nyssicola                   |
|                             |                               |                                   |                                        |
| Crépidote méchuleux         | Crepidotus calolepis          | Entolome étroit                   | Entoloma strictius                     |
| Crépidote mollet            | Crepidotus malachius          | Entolome étroit, variété isabelle | Entoloma strictius var. isabellinum    |
| Crépidote stipité           | Crepidotus stipitatus         | Entolome gris rosâtre             | Entoloma rhodopolium                   |
| Crinipelle majeure          | Crinipellis maxima            | Entolome gris souris              | Entoloma murinum                       |
| Crucibule lisse             | Crucibulum laeve              | Entolome jaune                    | Entoloma luteum                        |
| Cudonie circulaire          | Cudonia circinans             | Entolome jaune fuligineux         | Entoloma fumosoluteum Y. L. nom. prov. |
| Cudonie jaune               | Cudonia lutea                 | Entolome onduleux                 | Entoloma undatum                       |

|  | Noms français                     | Noms latins                   |  | Noms français                                   | Noms latins                |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Cystoderme cinabre                | Cystodermella cinnabarina     |  | Entolome printanier                             | Entoloma vernum            |
|  | Cystoderme grenu                  | Cystoderma granosum           |  | Entolome saumon                                 | Entoloma quadratum         |
|  | Cystoderme roussi                 | Cystoderma amianthinum        |  | Entolome soyeux                                 | Entoloma sericeum          |
|  | Cystoderme trompeur               | Cystoderma fallax             |  | Entolome subsinué                               | Entoloma subsinuatum       |
|  | Daldinie de Child                 | Daldinia childiae             |  | Entolome superbe                                | Entoloma formosum          |
|  | Dédale du chêne                   | Daedalea quercina             |  | Exidie glanduleuse                              | Exidia glandulosa          |
|  | Dermatose couleur de brique       | Hypomyces lateritius          |  | Fausse corne d'abondance (Trompette des morts ) | Craterellus fallax         |
|  | Dermatose des amanites            | Hypomyces hyalinus            |  | Fuligo blanche                                  | Fuligo candida             |
|  | Dermatose des bolets              | Hypomyces chrysospermus s. l. |  | Fuligo septique (fleur de tan)                  | Fuligo septica             |
|  | Dermatose des lactaires toisonnés | Hypomyces torminosus          |  | Galérine marginée                               | Galerina marginata         |
|  | Dermatose des russules            | Hypomyces lactifluorum        |  | Galle des collybies                             | Syzygospora mycetophila    |
|  | Dermatose olivâtre                | Hypomyces luteovirens         |  | Galle des collybies non bouclée                 | Syzygospora effibulata     |
|  | Entolome à écailles foncées       | Entoloma anatinum             |  | Ganoderme de Curtis                             | Ganoderma curtisii         |
|  | Entolome à long pied              | Entoloma lagenicystis         |  | Ganoderme de la pruche                          | Ganoderma tsugae           |
|  | Entolome à pied bleuté            | Entoloma asprellum            |  | Ganoderme plat ( Polypore des artistes)         | Ganoderma applanatum       |
|  | Entolome abortif                  | Entoloma abortivum            |  | Ganoderme sessile                               | Ganoderma sessile          |
|  | Entolome bicolore                 | Entoloma bicolor              |  | Géastre à trois plis                            | Geastrum triplex           |
|  | Entolome blafard                  | Entoloma luridum              |  | Géastre couronné                                | Geastrum coronatum         |
|  | Entolome blanc livide             | Entoloma lividoalbum          |  | Géastre minuscule                               | Geastrum minimum           |
|  | Entolome cendré                   | Entoloma albidum              |  | Géoglosse difforme                              | Geoglossum difforme        |
|  | Entolome de Kauffman              | Entoloma Kauffmanii           |  | Géoglosse glabre                                | Geoglossum glabrum         |
|  | Entolome de Murray                | Entoloma murrayi              |  | Géoglosse noir pourpré                          | Thuemenidium atropurpureum |
|  | Entolome élégant                  | Clitocella mundula            |  |                                                 |                            |
|  |                                   |                               |  |                                                 |                            |
|  | Gomphide glutineux                | Gomphidius glutinosus         |  | Hydne septentrional                             | Climacodon septentrionalis |
|  | Gomphide maculé                   | Gomphidius maculatus          |  | Hydne sinué (Pied-de-mouton)                    | Hydnum repandum s.l.       |
|  | Gomphide noicissant               | Gomphidius nigricans          |  | Hydne sinué, var. blanc. (Pied-de-mouton)       | Hydnum repandum var. album |
|  | Gomphide vineux                   | Chroogomphus vinicolor        |  | Hydne violacé                                   | Phellodon violascens       |
|  | Guépinie en helvelle              | Guepinia helvelloïdes         |  | Hygrophore à dents d'or                         | Hygrophorus chrysodon      |
|  | Gymnopile du sapin                | Gymnopilus sapineus           |  | Hygrophore à disque jaune                       | Hygrophorus flavodiscus    |
|  | Gymnopile jaune                   | Gymnopilus luteus             |  | Hygrophore à lames arquées                      | Hygrophorus camarophyllus  |
|  | Gymnopile pénétrant               | Gymnopilus aff. penetrans     |  | Hygrophore à lames étroites                     | Cuphophyllus angustifolius |
|  | Gymnopile réglisse                | Gymnopilus liquiritiae        |  | Hygrophore à lames marginées                    | Humidicutis marginata      |

|  | Noms français                              | Noms latins                            |  | Noms français                               | Noms latins                          |
|--|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Gyromitre commun                           | Gyromitra esculenta                    |  | Hygrophore à lames marginées, var. olivacée | Humidicutis marginata var. olivacea  |
|  | Gyromitre en turban                        | Gyromitra infula                       |  | Hygrophore à odeur agréable                 | Hygrophorus agathosmoides            |
|  | Hébelome croûte-de-pain                    | Hebeloma crustuliniforme               |  | Hygrophore à tête dorée                     | Humidicutis auratocephala            |
|  | Helvelle crêpue                            | Helvella crispa                        |  | Hygrophore ambigu                           | Gliophorus perplexus                 |
|  | Helvelle à long pied                       | Helvella macropus                      |  | Hygrophore boréal                           | Cuphophyllus borealis                |
|  | Helvelle à long pied, variété brève        | Helvella macropus var. brevis          |  | Hygrophore canescent                        | Cuphophyllus canescens               |
|  | Helvelle cupuliforme                       | Helvella cupuliformis                  |  | Hygrophore chanterelle                      | Hygrocybe cantharellus               |
|  | Helvelle élastique                         | Helvella elastica                      |  | Hygrophore conique                          | Hygrocybe conica                     |
|  | Helvelle lacuneuse                         | Helvella lacunosa                      |  | Hygrophore crête-de-coq                     | Hygrocybe coccineocrenata            |
|  | Hémipholiote du peuplier, variété d'Edmund | Hemipholiota populnea var. edmundii    |  | Hygrophore de Colemann                      | Cuphophyllus colemannianus           |
|  | Hémitrichie petite coupe                   | Hemitrichia calyculata                 |  | Hygrophore de March                         | Hygrocybe marchii                    |
|  | Hydne à pied court                         | Hydnellum stereosarcinon               |  | Hygrophore de Reid                          | Hygrocybe reidii                     |
|  | Hydne brun noirâtre                        | Phellodon melaleucus                   |  | Hygrophore de Secrétan                      | Hygrophorus secretanii               |
|  | Hydne conrescent                           | Hydnellum conrescens                   |  | Hygrophore des chevreuils                   | Hygrophorus capreolarius             |
|  | Hydne confluent                            | Phellodon confluens                    |  | Hygrophore des chutes Tahquamenon           | Hygrocybe tahquamenonensis           |
|  | Hydne corail                               | Hericium coralloides                   |  | Hygrophore des épinettes                    | Hygrophorus piceae                   |
|  | Hydne d'Amérique                           | Hericium americanum                    |  | Hygrophore des prés                         | Cuphophyllus pratensis               |
|  | Hydne noir                                 | Phellodon niger                        |  | Hygrophore des prés var. blanche            | Cuphophyllus pratensis var. pallidus |
|  | Hydne ombiliqué                            | Hydnum umbilicatum                     |  | Hygrophore du Canada                        | Hygrophorus canadensis               |
|  | Hydne orangé                               | Hydnellum aurantiacum                  |  | Hygrophore écarlate                         | Hygrocybe coccinea                   |
|  | Hydne scrobiculé                           | Hydnellum scrobiculatum                |  | Hygrophore fuligineux                       | Hygrophorus fuligineus               |
|  |                                            |                                        |  |                                             |                                      |
|  | Hygrophore grassex                         | Gliophorus irrigatus                   |  | Inocybe laineux                             | Inocybe lanuginosa                   |
|  | Hygrophore gris souris                     | Neohygrocybe nitrata                   |  | Inocybe lilacin                             | Inocybe lilacina                     |
|  | Hygrophore gris violacé                    | Cuphophyllus subviolaceus              |  | Inocybe rimeux                              | Pseudosperma rimosum                 |
|  | Hygrophore ivoire                          | Hygrophorus eburneus                   |  | Irpex laiteux                               | Irpex lacteus                        |
|  | Hygrophore jaunissant                      | Hygrocybe chlorophana                  |  | Laccaire à long pied                        | Laccaria longipes                    |
|  | Hygrophore luisant                         | Gloioxanthomyces nitidus               |  | Laccaire améthyste                          | Laccaria amethystina                 |
|  | Hygrophore mineur                          | Hygrocybe parvula                      |  | Laccaire bicolore                           | Laccaria bicolor                     |
|  | Hygrophore minuscule                       | Hygrocybe minutula                     |  | Laccaire noble                              | Laccaria nobilis                     |
|  | Hygrophore orangé                          | Hygrocybe aurantiacolutea Y. Lamoureux |  | Laccaire ocre pourpré                       | Laccaria ochropurpurea               |
|  | Hygrophore perroquet                       | Gliophorus psittacinus                 |  | Laccaire strié                              | Laccaria striatula                   |
|  | Hygrophore pointu                          | Hygrocybe acutoconica                  |  | Lactaire à centre foncé                     | Lactarius oculatus                   |
|  | Hygrophore poisseux                        | Gliophorus laetus                      |  | Lactaire à lait soufre                      | Lactarius tabidus                    |

|  | Noms français                  | Noms latins                |  | Noms français                    | Noms latins               |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
|  | Hygrophore ponceau             | Hygrocybe punicea          |  | Lactaire à lait verdissant       | Lactifluus glaucescens    |
|  | Hygrophore pudibond            | Hygrophorus pudorinus      |  | Lactaire à odeur de noix de coco | Lactarius glyciosmus      |
|  | Hygrophore pustuleux           | Hygrophorus pustulatus     |  | Lactaire à odeur d'érable        | Lactarius helvus          |
|  | Hygrophore remarquable         | Hygrophorus speciosus      |  | Lactaire à toison                | Lactarius torminosus      |
|  | Hygrophore russule             | Hygrophorus russula        |  | Lactaire à zones aqueuses        | Lactarius aquizonatus     |
|  | Hygrophore squamuleux          | Hygrocybe squamulosa       |  | Lactaire affine                  | Lactarius affinis         |
|  | Hygrophore vermillon           | Hygrocybe miniata          |  | Lactaire camphré                 | Lactarius camphoratus     |
|  | Hypholome à lames grises       | Hypholoma capnoides        |  | Lactaire cendré                  | Lactarius cinereus        |
|  | Hypholome couleur de brique    | Hypholoma lateritium       |  | Lactaire couleur de suie         | Lactarius lignyotus       |
|  | Hypoxyle en forme de fraise    | Hypoxylon fragiforme       |  | Lactaire de Gerard               | Lactifluus gerardii       |
|  | Inocybe à base verte           | Inosperma calamistratum    |  | Lactaire de Hibbard              | Lactarius mammosus        |
|  | Inocybe à disque blanc         | Inocybe albodisca          |  | Lactaire de Mackinaw             | Lactarius mackinawensis   |
|  | Inocybe à disque sombre        | Inocybe fuscodisca         |  | Lactaire décevant                | Lactifluus deceptivus     |
|  | Inocybe à lames terreuses      | Inocybe geophylla          |  | Lactaire des épinettes           | Lactarius deterrimus      |
|  | Inocybe à pied bulbeux         | Inocybe napipes            |  | Lactaire enfumé                  | Lactarius fumosus         |
|  | Inocybe de Cooke               | Inosperma cookei           |  | Lactaire fané                    | Lactarius vietus          |
|  | Inocybe des chutes Tahquamenon | Inocybe tahquamenonensis   |  | Lactaire gris                    | Lactarius griseus         |
|  | Inocybe hérissé                | Inocybe hystrix            |  | Lactaire humide                  | Lactarius uvidus          |
|  | Inocybe lacéré                 | Inocybe lacera             |  | Lactaire hygrophore              | Lactifluus hygrophoroides |
|  |                                |                            |  |                                  |                           |
|  |                                |                            |  |                                  |                           |
|  | Lactaire jaunâtre              | Lactifluus luteolus        |  | Lépiote aspérulée                | Echinoderma asperulum     |
|  | Lactaire jaune                 | Lactarius aspidioides      |  | Lépiote cortinaire               | Lepiota cortinarius       |
|  | Lactaire luisant               | Lactarius nitidus          |  | Lépiote crépue                   | Lepiota cristata          |
|  | Lactaire maculé                | Lactarius maculatus        |  | Lépiote déguenillée              | Chlorophyllum rhacodes    |
|  | Lactaire muqueux               | Lactarius mucidus          |  | Lépiote en bouclier              | Lepiota clypeolaria       |
|  | Lactaire poivré                | Lactifluus piperatus       |  | Lépiote féline                   | Lepiota felina            |
|  | Lactaire pseudo-flexuosus      | Lactarius pseudoflexuosus  |  | Lépiote lisse                    | Leucoagaricus leucothites |
|  | Lactaire pubescent             | Lactarius pubescens        |  | Lépiste inversé                  | Paralepista inversa       |
|  | Lactaire purpurin              | Lactarius subpurpureus     |  | Lépiste à odeur d'iris           | Lepista irina             |
|  | Lactaire représentatif         | Lactarius repraesentaneus  |  | Lépiste à odeur fétide           | Lepista graveolens        |
|  | Lactaire retroussé             | Lactarius resimus          |  | Lépiste cespiteux                | Lepista subconnexa        |
|  | Lactaire rougissant            | Lactarius vinaceorufescens |  | Lépiste des Marti                | Lepista martiorum         |
|  | Lactaire roux                  | Lactarius rufus            |  | Lépiste nu (Pied bleu)           | Lepista nuda              |
|  | Lactaire saumon                | Lactarius thyinos          |  | Leucopaxille blanc               | Leucopaxillus albissimus  |

| Noms français                                | Noms latins                             | Noms français                      | Noms latins                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lactaire scrobiculé, variété du Canada       | Lactarius scrobiculatus var. canadensis | Leucopholiote écaillée             | Leucopholiota decorosa                  |
| Lactaire sordide                             | Lactarius sordidus                      | Limacelle gluante                  | Limacella glischra                      |
| Lactaire trivial                             | Lactarius trivialis                     | Lycogale du bois                   | Lycogala epidendrum                     |
| Lactaire velouté                             | Lactifluus vellereus                    | Lyophylle en touffe                | Lyophyllum decastes                     |
| Lactaire velouteux                           | Lactifluus subvellereus                 | Marasme à odeur d'ail              | Mycetinis scorodoni                     |
| Lactaire velouteux, variété à lames espacées | Lactifluus subvellereus var. subdistans | Marasme à pied corné               | Marasmius cohaerens                     |
| Lactaire vineux                              | Lactarius hysginus                      | Marasme capillaire                 | Marasmius capillaris                    |
| Lactaire faux-fumosus                        | Lactarius fumosoides                    | Marasme des Oréades                | Marasmius oreades                       |
| Lentin anisé                                 | Neofavolus suavissimus                  | Marasme petite roue                | Marasmius rotula                        |
| Lentin écaillé                               | Neolentinus lepideus                    | Marasme sec                        | Marasmius siccus                        |
| Lentin en colimaçon                          | Lentinellus cochleatus                  | Mélanoleuque à pied court          | Melanoleuca brevipes                    |
| Lentin ours                                  | Lentinellus ursinus                     | Mélanoleuque à pied verruqueux     | Melanoleuca verrucipes                  |
| Lentin renard                                | Lentinellus vulpinus                    | Mélanoleuque familial              | Melanoleuca cognata                     |
| Léotie lubrifiée                             | Leotia lubrica                          | Mélanoleuque jaunâtre              | Melanoleuca alboflavida                 |
| Léotie visqueuse                             | Leotia viscosa                          | Mélanoleuque noir et blanc         | Melanoleuca melaleuca s.l.              |
| Lépiote à grandes spores                     | Lepiota magnispora                      | Microglosse enfumé                 | Microglossum fumosum                    |
| Lépiote à squames foncées                    | Lepiota fuscossquamea                   | Microglosse roux                   | Microglossum rufum                      |
|                                              |                                         |                                    |                                         |
| Mitrule irrégulière                          | Neolecta irregularis                    | Pézize baie                        | Peziza badia                            |
| Morille blonde                               | Morchella spp. (clade Esculenta)        | Pézize citrine                     | Calycina citrina                        |
| Morille noire                                | Morchella spp. (clade Elata)            | Pézize cupulée                     | Ascocoryne cylichnium                   |
| Mutin de Ravenel                             | Mutinus ravenelii                       | Pézize d'Agassiz                   | Lachnellula agassizii                   |
| Mycène à lames marginées                     | Hydropus marginellus                    | Pézize en bouclier variété blanche | Scutellinia scutellata var. leucothécia |
| Mycène à marge citrine                       | Mycena citrinomarginata                 | Pézize noirâtre                    | Pseudoplectania nigrella                |
| Mycène à pied filiforme                      | Mycena filipes                          | Pézize noircie                     | Bulgaria inquinans                      |
| Mycène à pied fin                            | Mycena capillaripes                     | Pézize pure                        | Neobulgaria pura                        |
| Mycène à pied rouge                          | Mycena haematopus                       | Pézize scutiforme                  | Pachyella clypeata                      |
| Mycène à tête mince                          | Mycena leptcephala                      | Pézize variable                    | Peziza varia                            |
| Mycène alcalin                               | Mycena alcalina                         | Pézize verdissante                 | Chlorociboria aeruginascens             |
| Mycène corticole                             | Mycena meliigena                        | Pézize vert-de-gris                | Chlorociboria aeruginosa                |
| Mycène de Léa                                | Mycena leaiana                          | Phéocollybie de Christina          | Phaeocollybia christinae                |
| Mycène en casque                             | Mycena galericulata                     | Phlébie radiante                   | Phlebia radiata                         |
| Mycène épingle                               | Rickenella fibula                       | Phlébie tremblante                 | Phlebia tremellosa                      |
| Mycène grêle                                 | Hemimycena gracilis                     | Pholiote à lames crénelées         | Hemistropharia albocrenulata            |

|  | Noms français             | Noms latins                    |  | Noms français                | Noms latins                |
|--|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
|  | Mycène pur                | Mycena pura                    |  | Pholiote à lames nombreuses  | Pholiota multifolia        |
|  | Mycène rose pâle          | Mycena rosella                 |  | Pholiote à spores rhomboïdes | Flammulaster rhombosporus  |
|  | Mycène sanguinolent       | Mycena sanguinolenta           |  | Pholiote changeante          | Kuehneromyces mutabilis    |
|  | Nodule noir du cerisier   | Apiosporina morbosa            |  | Pholiote des aulnes          | Flammula alnicola          |
|  | Omphale de Kauffman       | Xeromphalina kauffmanii        |  | Pholiote écailleuse          | Pholiota squarrosa         |
|  | Omphale en clochette      | Xeromphalina campanella        |  | Pholiote écumeuse            | Pholiota spumosa           |
|  | Omphale gaufrée           | Pseudoarmillariella ectypoides |  | Pholiote flamboyante         | Pholiota flammans          |
|  | Omphale lignicole         | Arrhenia epichysium            |  | Pholiote glutineuse          | Pholiota lenta             |
|  | Oreille alutacée          | Otidea alutacea                |  | Pholiote jaune citron        | Pholiota limonella         |
|  | Oreille de lièvre         | Otidea onotica                 |  | Pholiote squarreuse          | Pholiota squarrosoides     |
|  | Parasite des clavaires    | Helminthosphaeria clavariarum  |  | Phylloporé à base blanche    | Phylloporus leucomycelinus |
|  | Paxille à pied noir       | Tapinella atrotomentosa        |  | Pleurote de l'orme           | Hypsizygus ulmarius        |
|  | Paxille enroulé           | Paxillus involutus s. l.       |  | Pleurote du peuplier         | Pleurotus populinus        |
|  | Paxille faux-panus        | Tapinella panuoides            |  | Pleurote en éventail         | Panus conchatus            |
|  | Pézize orangée            | Aleuria aurantia               |  | Pleurote en huître           | Pleurotus ostreatus        |
|  | Pézize à spores épineuses | Peziza echinospora             |  | Pleurote étalé               | Pleurocybella porrigens    |
|  |                           |                                |  |                              |                            |
|  | Pleurote pétaloïde        | Hohenbuehelia petaloides       |  | Polypore boréal              | Climacocystis borealis     |
|  | Pleurote petit nid        | Phyllotopsis nidulans          |  | Polypore brûlé               | Bjerkandera adusta         |
|  | Pleurote poilu            | Pleurotus levis                |  | Polypore cannelle            | Coltricia cinnamomea       |
|  | Pleurote pulmonaire       | Pleurotus pulmonarius          |  | Polypore ciriné              | Onnia leporina             |
|  | Pleurote styptique        | Panellus stipticus             |  | Polypore de Cajander         | Rhodofomes cajanderi       |
|  | Pleurote tardif           | Sarcomyxa serotina             |  | Polypore de Huronie          | Laetiporus huroniensis     |
|  | Pleurote tesselé          | Hypsizygus tessulatus          |  | Polypore de Montagne         | Coltricia montagnei        |
|  | Pleurote voilé            | Pleurotus dryinus              |  | Polypore de Mounce           | Fomitopsis mounceae        |
|  | Plicature crispée         | Plicaturopsis crispa           |  | Polypore de Schweinitz       | Phaeolus schweinitzii      |
|  | Plutée à arêtes noires    | Pluteus atromarginatus         |  | Polypore des brebis          | Albatrellus ovinus         |
|  | Plutée à longues stries   | Pluteus longistriatus          |  | Polypore des clôtures        | Gloeophyllum sepiarium     |
|  | Plutée couleur de cerf    | Pluteus cervinus               |  | Polypore des pruches         | Fomitiporia tsugina        |
|  | Plutée d'Amérique         | Pluteus americanus             |  | Polypore d'hiver             | Lentinus brumalis          |
|  | Plutée en parasol         | Pluteus petasatus              |  | Polypore du bouleau          | Fomitopsis betulina        |
|  | Plutée fibrilleux         | Pluteus fibrillosus            |  | Polypore du sapin            | Trichaptum abietinum       |
|  | Plutée granuleux          | Pluteus granularis             |  | Polypore écailleux           | Cerioporus squamosus       |
|  | Plutée jaune fuligineux   | Pluteus flavofuligineus        |  | Polypore en ombelle          | Cladomeris umbellata       |
|  | Plutée nain               | Pluteus phlebophorus           |  | Polypore floriforme          | Spongiporus floriformis    |

| Noms français                    | Noms latins                 | Noms français            | Noms latins                    |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Plutée tomenteux                 | Pluteus tomentosulus        | Polypore fragile         | Fuscopostia fragilis           |
| Polypore blanc et noir           | Boletopsis leucomelaena     | Polypore fuligineux      | Ischnoderma resinosum          |
| Polypore à chapeau étroit        | Cerioporus leptcephalus     | Polypore géminé          | Oxyporus populinus             |
| Polypore à pores bleus           | Neolbatrellus caeruleoporus | Polypore gris            | Boletopsis grisea              |
| Polypore aggloméré               | Inonotus glomeratus         | Polypore gris carné      | Skeletocutis carneogrisea      |
| Polypore allume-feu (Amadouvier) | Fomes fomentarius           | Polypore noicissant      | Phellinus nigricans            |
| Polypore alvéolé                 | Neofavolus alveolaris       | Polypore oblique (Chaga) | Inonotus obliquus              |
| Polypore bai                     | Picipes badius              | Polypore parchemin       | Trichaptum biforme             |
| Polypore baumier                 | Spongiporus balsameus       | Polypore persistant      | Coltricia perennis             |
| Polypore baumier                 | Spongiporus balsameus       | Polypore radicaant       | Polyporus radicaatus           |
| Polypore benjoin                 | Ischnoderma benzoinum       | Polypore retroussé       | Antrodiaella semisupina        |
| Polypore blanc cendré            | Postia tephroleuca          | Polypore rutilant        | Hapalopilus rutilans           |
| Polypore blanc-de-neige          | Tyromyces chioneus          | Polypore soufré          | Laetiporus sulphureus          |
| Polypore bleu gris               | Cyanosporus livens          | Polypore styptique       | Amaropostia stiptica           |
|                                  |                             |                          |                                |
| Polypore tomenteux               | Onnia tomentosa             | Russule de Quélet        | Russula queletii               |
| Polypore vergeté                 | Cerioporus varius           | Russule décolorée        | Russula decolorans             |
| Polypore violet                  | Trichaptum fuscoviolaceum   | Russule déguisée         | Russula dissimulans            |
| Psathyrelle cespiteuse           | Britzelmayria multipedata   | Russule des forêts       | Russula silvicola              |
| Psathyrelle couleur de datte     | Homophron spadiceum         | Russule des marais       | Russula paludosa               |
| Psathyrelle de De Candolle       | Candolleomyces candolleanus | Russule du sapin         | Russula abietina               |
| Psathyrelle hydrophile           | Psathyrella piluliformis    | Russule émétique         | Russula emetica                |
| Psathyrelle pleureuse            | Lacrymaria lacrymabunda     | Russule fausse-pectinata | Russula pectinatoides          |
| Psathyrelle rayée                | Psathyrella delineata       | Russule feuille-morte    | Russula squalida               |
| Psathyrelle ridée                | Psathyrella corrugis        | Russule floconneuse      | Russula flocculosa             |
| Psathyrelle à spores abondantes  | Psathyrella conissans       | Russule fragile          | Russula fragilis sensu Shaffer |
| Ramaire à pointes vineuses       | Ramaria rubripermanens      | Russule fragrante        | Russula fragrantissima         |
| Ramaire à pointes violacées      | Ramaria violascens          | Russule granuleuse       | Russula granulata              |
| Ramaire brunissante              | Ramaria flavobrunnescens    | Russule hydrophile       | Russula hydrophila             |
| Ramaire de Kunz                  | Ramariopsis kunzei          | Russule jaune clair      | Russula claroflava s. l.       |
| Ramaire dorée                    | Ramaria aurea               | Russule jaune d'oeuf     | Russula vitellina              |
| Ramaire du sapin                 | Phaeoclavulina abietina     | Russule magnifique       | Russula pulchra                |
| Ramaire élégante                 | Ramaria formosa             | Russule malodorante      | Russula graveolens             |
| Ramaire étroite                  | Ramaria stricta             | Russule modeste          | Russula modesta                |
| Ramaire flasque                  | Phaeoclavulina flaccida     | Russule noire et blanche | Russula aff. albonigra         |
| Ramaire grêle                    | Ramaria gracilis            | Russule olivacée         | Russula olivacea               |

| Noms français                   | Noms latins                 | Noms français               | Noms latins                  |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ramaire jaune, variété pinicole | Ramaria flava var. pinicola | Russule pseudo-lepida       | Russula pseudolepida         |
| Ramaire meurtrie de brun        | Ramaria brunneicontusa      | Russule rugueuse            | Russula rugulosa             |
| Rhodote palmé                   | Rhodotus palmatus           | Russule variable            | Russula variata              |
| Russule à lames serrées         | Russula aff. densifolia     | Russule verdâtre            | Russula viridella            |
| Russule à odeur d'amande        | Russula grata               | Russule vert-de-gris        | Russula aeruginea            |
| Russule à pied court            | Russula brevipes            | Russule vineuse             | Russula vinosa               |
| Russule belette d'Amérique      | Russula aff. mustelina      | Satyre à dentelle           | Phallus duplicatus           |
| Russule boréale                 | Russula borealis            | Satyre de Ravenel           | Phallus ravenelii            |
| Russule brûlée                  | Russula adusta              | Satyre impudique            | Phallus impudicus            |
| Russule brunâtre                | Russula brunneola           | Scléroderme aréolé          | Scleroderma areolatum        |
| Russule charbonnière            | Russula cyanoxantha         | Scléroderme commun          | Scleroderma citrinum         |
| Russule compacte                | Russula compacta            | Scléroderme oignon          | Scleroderma cepa             |
| Russule croûteuse               | Russula crustosa            | Spatulaire à pied velouté   | Spathularia velutipes        |
| Russule de Katarina             | Russula katarinae           | Spatulaire jaune            | Spathularia flavida          |
| Russule de Marie                | Russula mariae              |                             |                              |
| Russule de Peck                 | Russula peckii              |                             |                              |
| Stémonite axifère               | Stemonitis axifera          | Tricholome à foulard        | Tricholoma focale            |
| Stérée hirsute                  | Stereum hirsutum            | Tricholome à grand voile    | Tricholoma magnivelare       |
| Stérée pourpre                  | Chondrostereum purpureum    | Tricholome à odeur de savon | Tricholoma saponaceum        |
| Stérée strié                    | Stereum striatum            | Tricholome brûlant          | Tricholoma aestuans          |
| Stérée tomenteuse               | Stereum subtomentosum       | Tricholome colombette       | Tricholoma columbetta        |
| Strophaire à anneau rugueux     | Stropharia rugosoannulata   | Tricholome de Davis         | Tricholoma davisiae          |
| Strophaire artique              | Protostropharia artica      | Tricholome décoré           | Tricholomopsis decora        |
| Strophaire bleutée              | Stropharia caerulea         | Tricholome élané            | Tricholoma stans             |
| Strophaire coronille            | Stropharia coronilla        | Tricholome équestre         | Tricholoma equestre          |
| Strophaire de Hard              | Stropharia hardii           | Tricholome fauve            | Tricholoma fulvum            |
| Strophaire de Hornemann         | Stropharia hornemannii      | Tricholome faux-sejunctum   | Tricholoma subsejunctum      |
| Strophaire des cervidés         | Protostropharia alcis       | Tricholome faux-sulphureux  | Tricholomopsis sulphureoides |
| Strophaire hémisphérique        | Protostropharia semiglobata | Tricholome faux-ustale      | Tricholoma aff. ustaloides   |
| Théléphore en entonnoir         | Thelephora caryophyllea     | Tricholome guêtré           | Tricholoma caligatum         |
| Théléphore à tête ramifiée      | Thelephora anthocephala     | Tricholome imbriqué         | Tricholoma imbricatioïdes    |
| Théléphore palmé                | Thelephora palmata          | Tricholome intermédiaire    | Tricholoma intermedium       |
| Théléphore terrestre            | Thelephora terrestris       | Tricholome jaune            | Tricholoma subluteum         |
| Tramète cinabre                 | Trametes cinnabarina        | Tricholome jaune fuligineux | Tricholoma fumosoluteum      |
| Tramète coupelle                | Trametes conchifer          | Tricholome malodorant       | Tricholoma inamoenum         |
| Tramète du bouleau              | Trametes betulina           | Tricholome nauséabond       | Tricholoma odorum            |
| Tramète gibbeuse                | Trametes gibbosa            | Tricholome ombré            | Pseudotricholoma umbrosum    |
| Tramète hirsute                 | Trametes hirsuta            | Tricholome orangé           | Tricholoma aurantium         |
| Tramète ochracée                | Trametes ochracea           | Tricholome petite flamme    | Tricholomopsis flammula      |

| Noms français                                               | Noms latins                  | Noms français                  | Noms latins              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Tramète parfumée                                            | Trametes suaveolens          | Tricholome prétentieux         | Tricholoma portentosum   |
| Tramète pubescente                                          | Trametes pubescens           | Tricholome rosâtre             | Tricholoma roseoacervum  |
| Tramète rougissante                                         | Daedaleopsis confragosa      | Tricholome roux                | Tricholoma vaccinum      |
| Tramète unicolore                                           | Cerrena unicolor             | Tricholome ruiné               | Tricholoma pessundatum   |
| Tramète versicolore                                         | Trametes versicolor          | Tricholome rutilant            | Tricholomopsis rutilans  |
| Trémelle à spores jaunes                                    | Dacrymyces chrysospermus     | Tricholome vergeté             | Tricholoma subacutum     |
| Trémelle conrescente                                        | Sebacina conrescens          | Tubaire raboteux               | Tubaria confragosa       |
| Trémelle faux-hydne                                         | Pseudohydnum gelatinosum     | Vesse de loup en coupe         | Lycoperdon excipuliforme |
| Trémelle foliacée                                           | Phaeotremella foliacea       | Vesse-de-loup de Curtis        | Lycoperdon curtisii      |
| Trémelle mésentérique                                       | Tremella mesenterica         | Vesse-de-loup élevée           | Calvatia elata           |
| Trémelle réticulée                                          | Tremella reticulata          | Vesse-de-loup en outre         | Lycoperdon utriforme     |
| Trémellodendron pâle                                        | Tremellodendron pallidum     | Vesse-de-loup géante           | Calvatia gigantea        |
| Trichoglosse de Walter                                      | Trichoglossum walteri        | Vesse-de-loup incarnate        | Lycoperdon subincarnatum |
| Tricholome à disque noir                                    | Tricholoma atrodiscum        | Vesse-de-loup perlée           | Lycoperdon perlatum      |
| Tricholome à écailles noires                                | Tricholoma aff. atosquamosum | Vesse-de-loup piriforme        | Apioperdon pyriforme     |
|                                                             |                              | Vesse-de-loup teintée de jaune | Lycoperdon flavotinctum  |
|                                                             |                              |                                |                          |
| Xylaire à long pied                                         | Xylaria longipes s.l.        |                                |                          |
| Xylaire du bois                                             | Xylaria hypoxylon            |                                |                          |
| Xylaire polymorphe                                          | Xylaria polymorpha           |                                |                          |
|                                                             |                              |                                |                          |
|                                                             |                              |                                |                          |
| Les noms en vert sont les espèces qui ont changées de nom   |                              |                                |                          |
| Les noms en rouge sont les espèces nouvellement identifiées |                              |                                |                          |